

## آئروسل سازی داروی ناتوان کننده مدتومیدین هیدروکلراید

\* هاشم کامرانی\*

دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، گروه شیمی  
(دریافت: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴، پذیرش: ۱۳۸۹/۱۰/۱۳)

### چکیده

در این تحقیق، تهیه و بهینه‌سازی فرمولاسیون اسپری و آئروسل سازی داروی ناتوان کننده مدتومیدین هیدروکلراید صورت گرفته است. در این فرمولاسیون‌ها اجزایی شامل دارو، حلal (متانول، اتانول و ایزoproپانول)، اسپان ۱۵ و پیشرانه (پروپان) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای تهیه اسپری، کلیه اجزاء باید یک محلول مایع تک فازی تشکیل می‌دهند. تست‌های اولیه و رفتار فازی فرمولاسیون حاوی دارو، الكل، اسپان ۱۵ و پیشرانه (پروپان) و نیز رفتار فازی مقادیر متفاوت از داروی مدتومیدین هیدروکلراید بر حسب مقادیر متفاوت از حلal‌های اتانول، متانول و ایزoproپیل الكل و پیشرانه پروپان مورد بررسی قرار گرفته و حد اکثر پروپان مصرفی برای تشکیل محلول تک فازی در حالت‌های مختلف تعیین شد. برای داروی مدتومیدین هیدروکلراید، اتانول و ایزoproپانول نسبت به متانول، حلal‌های مناسب‌تری هستند. با توجه به اطلاعات به دست آمده از آزمایشات انجام گرفته، فرمولاسیون بهینه دارو با بالاترین غلظت ممکن تعیین شده است. فرمولاسیون مدتومیدین هیدروکلراید ۵/۵٪ با استفاده از ۱ گرم مدتومیدین هیدروکلراید، ۱۰ میلی‌لیتر اتانول (۴۴٪)، ۰/۲۵ گرم اسپان ۱۵ (۱/۴٪) و ۲۰ میلی‌لیتر پروپان (۴۹٪) به دست آمد و آئروسل مطلوب (از لحاظ پایداری محیطی) بعد از رهاسازی از قوطی اسپری حاصل شد.

**کلیدواژه‌ها:** آئروسل، مدتومیدین هیدروکلراید، پیشرانه؛ ناتوان کننده، رفتار فازی

## Aerosolization of Medetomidine Hydrochloride as an Incapacitating Agent

H. Kamranpey

Department of Chemistry, Imam Hossein University

### Abstract


In this study, the preparation and optimization of spray formulations and aerosolization of Medetomidine hydrochloride as incapacitating agent are investigated. Spray formulation include the drug, solvents (methanol, ethanol and isopropanol), span 85 and propellant (propane). In order for spray preparation, all of the components should form a single phase solution. Results of initial tests and phase behavior of different combination of Medetomidine hydrochloride, alcohol, span 85 and propellant (propane) were checked. The phase behavior of different amount of components was studied and the maximum amount of propane needed for formation of a single-phase solution was determined. Ethanol and isopropanol are more suitable solvents compared to methanol. According to data obtained from different experiments, the optimized formulation with the highest possible concentration of Medetomidine hydrochloride was obtained. Single phase formulation with 5.5% of Medetomidine hydrochloride includes 1g Medetomidine hydrochloride, 10ml of ethanol (44%), 0.25g of span85 (1.4%) and 20ml of propane (49%). This formulation, released from a spray can, led to a stable aerosol.

**Keywords:** Aerosol, Medetomidine Hydrochloride, Propellant; Incapacitate, Phase Behavior

\* Corresponding author E-mail: kamran\_6622@yahoo.com

Passive Defence Sci. & Technol. 2011, 3, 51-56

بستگی به میزان دوز مصرفی و مدت زمان تجویز دارد. همچنین باعث آرامبخشی عمیق و استراحت، کاهش حساسیت به محركهای محیطی و تسکین انتباضاً خودبهخودی عضلات می‌گردد و همین خواص آن را به عنوان یک داروی ناتوان‌کننده مطرح کرده است که در مورد بی‌حرکت‌سازی حیوانات وحشی نیز به کار رفته است [۳-۸].



شکل ۱. ساختار نمک متومیدین هیدروکلراید

مطالعات گسترده‌ای در زمینه آئروسل‌سازی داروها انجام شده است [۹-۱۷]. برخی از داروها مانند ضددردهای نارکتیک برای التیام دردهای ملایم و شدید استفاده می‌شوند، مخصوصاً اگر این دردها در قسمت‌های درونی بدن باشد. ضددردهای نارکتیک معمولاً به صورت تزریق زیر پوستی، درون عضلانی یا درون رگی، از طریق دهان به صورت شربت، قرص (زبرزبانی) و کپسول‌ها یا به روش مقعدی و شیافت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سال ۱۹۵۰ روش دوز فشاری تنفسی (روش استنشاقی) اختراع شد و روش تنفسی، رایج‌ترین روش برای مصرف داروهای برونژیتی و استرتوئیدی در مورد بیماران مبتلا به آسم قرار گرفت. در مقایسه با روش‌های دیگر مصرف دارو، طریقه استنشاقی به سهولت مورد استفاده قرار گرفته و به سرعت بیشترین تاثیر را می‌گذارد و دارای عوارض کمتری است. اخیراً مصرف داروهای دیگر نظیر ارگوتامین (برای دردهای برونژیتی) از طریق استنشاق از یک منبع تنفسی تحت فشار پیشنهاد شده است [۹]. در ترکیبات دارویی آئروسل‌سازی شده به وسیله پیشرانه گازی، دارو به خوبی در محیط پیشرانه و دیگر اجزاء فرمولاسیون توزیع شده و اغلب به صورت سوسپانسیون می‌باشد. گازهای پیشرانه‌ای برای کاربردهای دارویی بایستی از لحاظ سمیت، پایداری، فشار بخار، چگالی و خواص انحلال، دارای ویژگی‌های قابل قبول باشند. این فرمولاسیون‌ها همچنین حاوی مواد فعال سطحی مانند فسفولیپیدها (مثل لیستنین)،

## ۱. مقدمه

آئروسل‌ها در واقع ذرات بسیار ریز مایع و جامد هستند که به صورت کاملاً یکسان و یکنواخت در هوا پراکنده می‌شوند و پایداری محیطی آن‌ها بستگی به اندازه ذرات و تاثیر نیروی جاذبه زمین بر روی این ذرات دارد. آئروسل‌ها توسط عوامل طبیعی یا توسط دستگاه‌ها تهیه می‌شوند و بر اساس اندازه ذرات، ترکیبات تشکیل‌دهنده، نوع پیشرانه مورد استفاده و حتی شیوه تعلیق ذرات، به گروه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌گردد [۱]. از فناوری آئروسل‌سازی در زمینه‌های مختلف از قبیل صنعت، صنایع، نظامی، کشاورزی، وسائل آرایشی بهداشتی و به خصوص در پزشکی و تهیه اسپری‌های دارویی استفاده می‌شود. استفاده از آئروسل‌سازی در زمینه پزشکی و تهیه داروهای استنشاقی به ویژه جهت معالجه بیماران آسمی و بیمارانی که مشکلات ریوی دارند بسیار متداول بوده و مطالعات زیادی در این خصوص انجام گرفته است؛ زیرا استفاده از داروها از طریق استنشاقی به کاربرد از طریق تزریق درون وریدی یا زیرجلدی و یا گوارشی ارجحیت دارد. استعمال دارو به طریق استنشاقی باعث می‌شود که مصرف دارو به سهولت صورت گرفته و در مدت زمان کوتاه بیشترین تاثیر را داشته باشد و تاثیرات مضر و منفی که استعمال دارو از روش‌های دیگر بر روی کبد و معده و دیگر اعضای بدن می‌گذارد، در این روش وجود ندارد.

## ۲. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی داروی متومیدین هیدروکلراید

متومیدین هیدروکلراید (شکل ۱) یک ترکیب نارکوتیک گیرنده آلفا دو-آدرنرژیک و مسکن و ضد درد است. این دارو باعث تحریک گیرنده‌های مرکزی مربوط به آرامبخشی و بی‌دردی می‌شود و قوی‌ترین اگونیست آلفا دو می‌باشد که برای استفاده بالینی در طب کاربرد دارد. استفاده از این دارو باعث تسهیل عمل جراحی‌های کوچک و کوتاه‌مدت (بدون نیاز به بی‌هوشی) می‌شود. این ترکیب همچنین برای کنترل و نیز افزایش فشار خون پیرامون محل‌های انتباضاً ماهیچه‌ای و عضلانی استفاده شده است [۲]. تاثیرات این دارو مشابه فنتانیل سیترات است ولی اثرات جانبی (مانند ایست تنفسی و...) آن بسیار کمتر است [۳]. متومیدین هیدروکلراید به صورت قوی و غیر مخدّر باعث آرامبخشی و بی‌حسی می‌شود و اثرات آن

این تحقیق تهیه و بهینه‌سازی فرمولاسیون اسپری شامل مدتومیدین هیدروکلراید، حلال(مانول، اتانول و ایزوپروپانول)، اسپان ۸۵ و پیشرانه(پروپان) و آثروسلسازی داروی ناتوان- کننده مدتومیدین هیدروکلراید مورد بررسی قرار گرفته است.

## ۲. بخش تجربی

### ۲-۱. مواد

داروی مدتومیدین هیدروکلراید ۹۸٪ به صورت تجاری از کشور چین و الكلها (اتanol، مانول و ایزوپروپانول) و اسپان ۸۵ (با خلوص بالاتر از ۹۹٪) از شرکت مرک تهیه شده بودند. همچنین پروپان (از شرکت بوتان گاز) به عنوان پیشرانه و حلال مورد استفاده قرار گرفت.

### ۲-۲. تهیه فرمولاسیون اسپری ۵٪ مدتومیدین هیدروکلراید

در داخل یک کپسول شیشه‌ای ۱۰۰ میلی‌لیتری با قابلیت تحمل فشار بالا (۱۰-اتمسفر)، ۱ گرم مدتومیدین هیدروکلراید در ۱۰ میلی‌لیتر (۸ گرم) اتانول حل شده و کاملاً به صورت یک فازی و شفاف درآمد. سپس ۰/۲۵ گرم از اسپان ۸۵ به کپسول شیشه‌ای اضافه گردید. در نهایت ۰/۲۰ میلی‌لیتر پروپان (۱۰ گرم) به عنوان پیشران به کپسول منتقل شد تا یک مخلوط تک فازی به دست آید. این محلول در طول زمان (به مدت چندین هفته) بسیار پایدار بود و رسوب مدتومیدین هیدروکلراید در آن مشاهده نشد. سپس با سرد کردن ظرف اسپری فلزی، مخلوط از طریق اتصال کپسول شیشه‌ای، به داخل آن وارد گردید.

یک استر پلی‌الکلی(مثل سوربیتول)، اسیدهای چرب اشباع شده بالا یا اشباع نشده(مثل اسید استئاریک، پالمیتیک یا اولئیک)، سوربیتان تری‌اولئات یا یک پلی‌اتوکسی‌سوربیتان استر(اسید چرب بالا و غیراشباع) نیز می‌باشد. در برخی موارد نیز سوسپانسیون‌های تولید شده با گاز پیشرانه جدید تمایل به جداشدن دارند که سوسپانسیون‌های جدا شده می‌توانند به سهولت توسط عمل هم‌زدن دوباره به شکل اولیه برگردند.<sup>[۱۰]</sup>

ایده‌آل‌ترین شکل فرمولاسیون دارو قبل از آثروسلسازی آن، ایجاد یک محلول تک فازی از دارو و دیگر اجزاء به همراه پیشرانه گازی است. فنتانیل سیترات یکی از داروهایی است که فرمولاسیون آن مورد بررسی قرار گرفته تا به صورت استنشاقی مصرف شود. حلال‌هایی مانند اتانول و ایزوپروپیل الكل، اسپان ۸۵ و طیف گسترده‌ای از پیشرانه‌ها ممکن است در فرمول‌بندی‌های آثروسل مورد استفاده قرار گیرند. انواع پیشرانه‌های متداول شامل تری‌کلرومونوفلورومتان، دی‌کلرودی‌فلورومتان، دی‌کلرومونوفلورومتان، منوكلرودی‌فلورومتان و هیدروکربن‌هایی مثل پروپان، بوتان، ایزوپوتان، پنتان، ایزوپنتان، نئوپنتان و ترکیبات آن‌ها می‌باشند.<sup>[۴]</sup>


یک نمونه از فرمولاسیون دارویی شامل ۰/۰۱۸ گرم فنتانیل سیترات، ۰/۰۲۱ گرم اسپان ۸۵، ۰/۹۷ گرم پیشرانه CFC11، ۰/۶ گرم پیشرانه CFC12 با مجموع ۸/۲۳ گرم فرمولاسیون می‌باشد که به درون یک ویال آلومینیومی مسطح ۵ میلی‌لیتری مجهز به دریچه ۵۰ میکرو‌لیتری وارد می‌شود. دوز دارویی در هر استعمال با این دریچه حدود ۱۰۰ میکروگرم از دارو است ولی می‌توان دوز دارویی را با تغییر اندازه دریچه تغییر داد. در

جدول ۱. برخی فرمولاسیون‌های گزارش شده برای آثروسلسازی برخی از داروها<sup>[۹]</sup>

دارو	روغن آلی اشباع	پیشرانه	حلال
اسکتروپیوم برومید ۰/۰۱	٪ ۰/۰۱	سویا لكتین	پنتان ٪ ۰/۹۵/۹ HCFC 227
فنوترون ٪ ۰/۰/۳	٪ ۰/۰۱	سویا لكتین	پنتان ٪ ۰/۱۹/۶ HCFC 134
ایبراتروپیوم برومید ٪ ۰/۰/۱	٪ ۰/۰۱	سویا لكتین	پنتان ٪ ۰/۴۹/۸ CFC 11
سالبوتامول ٪ ۰/۰/۳	٪ ۰/۰۲	اسپان	پنتان ٪ ۰/۱۹/۵ CFC 12
فنتانیل سیترات ٪ ۰/۰/۴۶	٪ ۰/۰۱۶ ۸۵ (۱/۲ میلی لیتر)	اسپان ٪ ۰/۸۵/۹ HCFC 134	اتanol ٪ ۰/۱۳/۵ (۱۱۵/۷ میلی لیتر)
فنتانیل سیترات ٪ ۰/۰/۵۰	٪ ۰/۰۸ ۸۵ (۳/۱ گرم)	اسپان ٪ ۰/۸۳/۹ HCFC 134	اتanol ٪ ۰/۱۴/۷ (۱۱۵/۷ میلی لیتر)
فنتانیل سیترات ٪ ۰/۰/۰۵	٪ ۰/۰۵۳ ۸۵ (۳/۱ گرم)	اسپان ٪ ۰/۸۵/۹ HCFC 134	اتanol ٪ ۰/۱۴/۸ (۱۱۵/۴ میلی لیتر)
فنتانیل سیترات ٪ ۰/۰/۰۴۶	٪ ۰/۰۰۱۶ ۸۵ (۳/۱ گرم)	اسپان ٪ ۰/۸۵/۹ HCFC 134	اتanol ٪ ۰/۱۳/۵ (۱۱۵/۸ میلی لیتر)

مدتومیدین هیدروکلراید به همراه ۰/۰۵-۰/۰۵ گرم اسپان ۸۵ با استفاده از ۰/۵-۰/۵ میلی لیتر متانول و تزریق ۱۵ میلی لیتر پروپان منجر به یک مخلوط تکفازی گردید.

با توجه به تست‌های اولیه انجام گرفته توسط حلال (متانول و متانول) که از مقادیر کمتر دارو استفاده شده بود، در قدم بعدی غلظت دارو افزایش یافت، ولی دیگر مخلوط تکفازی حاصل نمی‌شد و با افزایش پروپان، یک مخلوط دو فازی به دست می‌آمد. در نتیجه برای تشکیل محلول تک فازی با غلظت بالا از دارو و عدم تشکیل مخلوط دوفازی به صورت مایع - مایع یا مایع-جامد نسبت خاصی از پروپان و حلال باید در نظر گرفته شود. پروپان نقش اساسی در تشکیل آئروسل دارد؛ زیرا تنها جزء فرار با نقطه جوش ۲۰ درجه سانتی گراد در فرمولاسیون است که با تبخیر خود بعد از رهاسازی فرمولاسیون در هوا، منجر به تشکیل آئروسلی متتشکل از الكل، اسپان ۸۵ و مدتومیدین هیدروکلراید می‌گردد. الكل موجود در آئروسل با توجه به اندازه ذره به سرعت تبخیر شده و آئروسل حاصل فقط حاوی دارو و اسپان ۸۵ خواهد بود. بدین ترتیب، اندازه آئروسل، به میزان نسبی پروپان نسبت به دارو، اسپان ۸۵ و الكل وابسته است. با توجه به این آزمایشات و نتایج آن‌ها و برای رسیدن به فرمولاسیون بهینه که در آن غلظت بالایی از دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین با توجه به این‌که اسپری تهیه شده در دمای محیط باید به صورت پایدار و تکفازی باشد، شرایط مناسب با استفاده از مقادیر متفاوت از داروی مدتومیدین هیدروکلراید، اسپان ۸۵ و حلال‌های متانول و ایزوپروپانول، حداقل میزان پروپان برای تشکیل محلول تکفازی در شکل‌های (۲) و (۳) ارائه شده‌اند.



شکل ۲. منحنی تغییرات پروپان در مقابل متانول برای تهیه محلول تکفازی حاوی مقادیر مختلف از مدتومیدین هیدروکلراید در حضور ۰/۰۵ گرم اسپان

### ۳. نتایج و بحث

به دست آوردن یک محلول تک فازی و یکنواخت از مخلوط پیشرانه، دارو به شکل نمک و دیگر اجزاء فرمولاسیون، یکی از پارامترهای مهم برای به دست آوردن فرمولاسیون بهینه و تشکیل آئروسل، بعد از پخش این مخلوط در محیط است. با توجه به اینکه مخلوط دارو، اسپان ۸۵ و پیشرانه (پروپان) در هیچ شرایطی یک محلول تک فازی تشکیل نمی‌داد، لذا استفاده از یک حلال برای حل کردن دارو ضروری بود. برای این منظور از الكل به عنوان حلال استفاده شد و دارو ابتدا در حلال حل شده و با انتقال پروپان یک مخلوط تک فازی به دست آمد. برای پی بردن به رفتار فازی مواد تشکیل دهنده فرمولاسیون با یکدیگر، مقادیر متفاوتی از مواد مانند اسپان ۸۵ با پیشرانه و الكل (حلال) شامل متانول، ایزوپروپانول با پیشرانه و همچنین مخلوط اسپان و الكل با پیشرانه و در ادامه، مخلوطی از مقادیر متفاوت داروها، اسپان ۸۵ و الكل با پیشرانه مورد آزمایش قرار گرفته و رفتار فازی (تک فازی و دو فازی بودن آن-) بررسی شد. با توجه به اینکه سه جزء اسپان ۸۵، الكل (حلال) و پروپان در دمای محیط تشکیل محلول تکفازی می‌دهند، لذا در ادامه با افزایش جزء اصلی فرمولاسیون (داروی مدتومیدین هیدروکلراید) به این اجزاء و برای به دست آوردن یک محلول تکفازی، نقش پروپان و حلال و نسبت این دو جزء برای تشکیل مخلوط تکفازی یک اصل مهم می‌باشد. یکی از فاکتورهای مهم در تهیه فرمولاسیون بهینه اسپری برای آئروسل‌سازی، استفاده از غلظت بالای داروی مدتومیدین هیدروکلراید است تا اسپری مورد نظر بیشترین تأثیر را داشته باشد. میزان استفاده از حلال و اسپان ۸۵ باید کمترین مقدار، و میزان پروپان مصرفی باید بیشترین مقدار ممکن باشد تا محلول تکفازی به دست آمده و اسپری آن در محیط منجر به آئروسل‌هایی با ذرات بسیار ریز و پایدار گردد.

تست‌های اولیه نشان داد که ۰/۰۱ گرم از مدتومیدین هیدروکلراید با استفاده از ۰/۵-۰/۵ میلی لیتر متانول، ۰/۰۵-۰/۵ میلی لیتر پروپان در دمای محیط به یک محلول تکفازی منجر می‌شود. با توجه به لزوم استفاده حداقل از الكل، نتایج این تست‌ها نشان داد که در غلظت‌های ۰/۰۱٪ از مدتومیدین هیدروکلراید، میزان ۰/۵ میلی لیتر متانول برای تهیه فرمولاسیون اسپری تکفازی توسط ۱۵ میلی لیتر پروپان کافی است. تست‌های انجام شده از مقادیر ۰/۰۱ و ۰/۰۲ گرم از


می توان نتیجه گرفت که در مورد ترکیب مدتومیدین کلرايد، حلال اتانول بهتر و مناسب‌تر از دو حلال ایزوپروپانول و متانول است.

#### ۴. نتیجه‌گیری

در این تحقیق، تهیه و بهینه‌سازی فرمولاسیون اسپری و آئروسل‌سازی مدتومیدین هیدروکلرايد به انجمار رسیده است. این فرمولاسیون شامل دارو، حلال (اتanol، متانول، ایزوپروپانول)، اسپان ۸۵ و پروپان بود که باید برای تهیه آئروسل تشکیل یک مخلوط تک فازی می‌دانند. برای این منظور ابتدا آزمایش‌های اولیه برای بررسی رفتار فازی اجزاء فرمولاسیون (الکل، اسپان ۸۵ و پروپان) در دمای محیط صورت گرفت، سپس با اضافه نمودن مقادیر کم دارو (۰/۰۱ تا ۰/۲۰ گرم) به این فرمولاسیون‌ها، رفتار فازی آن‌ها بررسی گردید. در ادامه، تغییرات میزان پروپان نسبت به تغییرات مقادیر الکل‌های متفاوت برای تشکیل محلول تکفازی با غلظت بالا از دارو در حضور ۰/۰۵ گرم اسپان ۸۵ بررسی شد. بدین ترتیب، فرمولاسیون بهینه ۵/۵٪ مدتومیدین هیدروکلرايد در کپسول شیشه‌ای تحت فشار تهیه گردید و بعد از بررسی پایداری محلول در طول زمان (از لحاظ رسوب دارو) به داخل ظرف اسپری وارد گردید. اسپری محلول ۵/۵٪ در محیط، منجر به آئروسل‌هایی شد که با پایداری محیطی بسیار خوب، به صورت ابری از ذرات بسیار ریز جامد در فضا کاملاً پخش می‌شدند و جذب به جداره‌های ظرف طی چند ساعت مشاهده نشد.

#### ۷. مراجع

- [1] Fuchs, N. A. "The Mechanics of Aerosol."; Pergamon, Oxford, 1964.
- [2] Paris, A.; Tonner, P. H. "Dexmedetomidine in Anaesthesia."; Current Opinion in Anaesthesiology 2005, 18(4), 412-8.
- [3] Fernandez-Moran, Jesus; Perez, Emi; Sammratin, Marta; Saavedra, Deli; Manteca-Vilanova, Xavier "Reversible Immobilization of Eurasian Otters with a Combination of Ketamine and Medetomidine."; Journal of Wildlife Diseases 2001, 37(3), 561-565.
- [4] Fournier-Chambrillon, Christine; Chusseau, Jean-Pierre; Dupuch, Julien; Maizeret, Christian; Fournier, Pascal "Immobilization of Free-Ranging European Mink (*Mustela Lutreola*) and Polecat (*Mustela Putorius*) with Medetomidine-Ketamine and Reversal by Atipamezole."; Journal of Wildlife Diseases 2003, 39(2), 393-399.



شکل ۳. منحنی تغییرات پروپان در مقابل ایزوپروپانول برای تهیه محلول تکفاری حاوی مقادیر مختلفی از مدتومیدین هیدروکلرايد در حضور ۰/۰۵ گرم اسپان

در کلیه آزمایش‌ها، ابتدا نمک مدتومیدین هیدروکلرايد در حداقل مقدار ممکن از الکل حل شد تا محلولی شفاف به دست آید و سپس پروپان لازم قبل از دوفازی شدن محلول به آن اضافه شد. این عمل برای مقادیر متفاوتی از نمک مدتومیدین هیدروکلرايد تکرار شد. با ثابت گرفتن میزان مواد دیگر و افزایش حلال، می‌توان محلول تکفازی و شفاف را با مقدار بیشتری از پروپان به دست آورد ولی درصد ماده موثره در فرمولاسیون کاهش می‌یابد. با افزایش مدتومیدین هیدروکلرايد در فرمولاسیون، میزان پروپان مصرفی بسیار کاهش می‌یابد: چون به محض اضافه کردن پروپان، الکل (که به عنوان حلال، مدتومیدین را در خود حل کرده است) در پروپان حل شده و با گذشت زمان ماده جامد در محلول رسوب می‌کند. در این صورت و با افزایش مقدار مدتومیدین هیدروکلرايد، باید از مقدار بیشتری الکل استفاده کرد (مقدار بیشتر از آنچه برای حل کردن مدتومیدین هیدروکلرايد لازم است) تا با اضافه نمودن مقدار کافی از پروپان (برای آئروسل‌سازی) به محلول، مخلوطی تکفازی و شفاف به دست آید. از لحاظ عملی نیز، مدتومیدین هیدروکلرايد ابتدا در اتانول حل شده و سپس با اضافه نمودن هیدروکلرايد کاهش ممکن از پروپان به آن اضافه می‌شود تا حدی که مخلوط کاملاً یکفازی باقی بماند و هیچ‌گونه فرآیند تشکیل ابر و رسوب به وجود نیاید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در مقادیر کم دارو (۰/۰۵ گرم)، شیب منحنی بالا است و در مقادیر بیشتری از پروپان، مخلوط تک فازی باقی می‌ماند و با افزایش میزان حلال نیز می‌توان از مقدار بیشتری پروپان استفاده نمود. اما با افزایش میزان دارو شیب منحنی‌ها کاهش می‌یابد که نشان از کاهش میزان پروپان مصرفی برای تشکیل محلول تک فازی دارد. با توجه به شیب منحنی‌ها و تست‌های انجام‌شده

- [5] Wolfe, L. L.; Goshorn, C. T.; Baruch-Mordo, S. "Immobilization of Black Bears (*Ursus Americanus*) with a Combination of Butorphanol, Azaperone, and Medetomidine."; *Journal of Wildlife Diseases* 2008, 44 (3), 748-752.
- [6] Mich, P. M.; Wolfe, L. L.; Sirochman, T. M.; Sirochman, M. A.; Davis, T. R.; Lance, W. R.; Miller, M. W. "Evaluation of Intramuscular Butorphanol, Azaperone, and Medetomidine and Nasal Oxygen Insufflations for the Chemical Immobilization of White-Tailed Deer, *Odocoileus Virginianus*"; *Journal of Zoo and Wildlife Medicine* 2008, 39 (3), 480-487.
- [7] Hanley, C. S.; Siudak-Campfield, J.; Paul-Murphy, J.; Vaughan, C.; Ramirez, O.; Keuler, N. S.; Sladky, K. K. "Immobilization of Free-Ranging Hoffmann's Two-Toed and Brown-Throated Three-Toed Sloths Using Ketamine and Medetomidine: A Comparasion of Physiologic Parameters."; *Journal of Wildlife Diseases* 2008, 44 (4), 938-945.
- [8] Votava, M.; Hess, L.; Krsiak, M. "Selective Antiaggressive Effect of an Alpha-2 Adrenoceptor Agonist Naphthylmedetomidine in Mice"; *Aggressive Behavior* 2008, 34(4), 394-403.
- [9] Purewal, Tarlochan Singh; Wilkinson, Anthony; Lambert, Alison Lesley; Smith, David Keith; Donnell, David; Kuepper, Anton "Fentanyl Containing Aerosol Compositions"; WO Patent 9,007,333, 1990.
- [10] Weil, Hans. Herman; Daab, Ottfried "Suspension Aerosol Formulations of Pharmaceutical Products"; US Patent 0,031,548, 2005.
- [11] Sciarra, J. J.; Cutie, A. J. "Pharmaceutical Aerosols, in Modern Pharmaceutics"; Banker, G. S.; Rhodes, C. T., Eds., Marcel Dekker Inc., New York, 1990, 605-634.
- [12] Thiel, C. "From Susie's Question To CFC Free: An Inventor's Perspective on Forty Years of MDI Development and Regulation in Respiratory Drug Delivery"; Dalby, R. N.; Byron, P. R.; Farr, S. J. Eds., Interpharm Press, Inc., Phoenix, AZ, 1996, 115-123.
- [13] Lemahieu, Edward; Jones, Charles; Stern, Tom; Hebrank, Jack; Hunter, Charles Eric; Duvall, Lyndell; Hartley, Chris; Ballou, Bernard L. Jr; Hunter, Jocelyn; Mcneil, Laurie; Wetzel, Paul; Criss, Ron "Methods and Systems of Delivering Medication via Inhalation"; WO Patent 2008,116,165, 2008.
- [14] Conte, Ubaldo; Giunchedi, Paolo "Prolonged-Release Oral Pharmaceutical forms Containing Active Substances Having a Solubility Dependent Upon the PH Value"; WO Patent 93,00,889, 1993.
- [15] Gallem, Thomas; Gowenlock, Kevin Grant; Lynch, Robert Carlton "Aerosol Medication Inhalation System"; US Patent 2009,090,355, 2009.
- [16] Hodges, Craig C.; Lloyd, Peter M.; Mufson, Daniel; Rogers, Daniel D.; Wensley, Martin J. "Delivery of Aerosols Containing Small Particles Through an Inhalation Route"; US Patent 2003,035,776, 2003.
- [17] Wensley, Martin J.; Hodges, Craig C.; Rogers, Daniel D.; Lloyd, Peter M.; Mufson, Daniel "An Aerosol Forming Device for Use in Inhalation Therapy"; AU Patent 2007,207,865, 2007.